



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๒ / ๒๕๖๔

ลำดับ	เรื่อง	หน่วยงาน	เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)			
๑.	วัคซีนโควิด-19 และ วัคซีนไขหวัดใหญ่ เว้นระยะการฉีดอย่างไร ?	กระทรวงสาธารณสุข	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
๒.	ข้อปฏิบัติผู้ป่วย “โรคความดันโลหิตสูง” กับการฉีดวัคซีนโควิด-19	สำนักนายกรัฐมนตรี	-
๓.	เพิ่มความคุ้มครองประกันโควิด-19 ครอบคลุมถึงการฉีดนอกโรงพยาบาล	กระทรวงการคลัง	-
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			
๔.	เตือนภัยนายจ้าง! อย่าหลงเชื่อ แอบอ้างรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว	กระทรวงแรงงาน	-
๕.	เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการเก็บเห็ดป่ามารับประทาน	กระทรวงสาธารณสุข	-

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้อย่างเฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
- ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๑๔๔๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
- จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๒๒ / ๒๕๖๔ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมควบคุมโรค

ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒

๑) หัวข้อเรื่อง วัคซีนโควิด-19 และ วัคซีนไขหวัดใหญ่ เว้นระยะการฉีดอย่างไร ?

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง วัคซีนโควิด-19 และ วัคซีนไขหวัดใหญ่ เว้นระยะการฉีดอย่างไร ?

ประชาชนหลายท่านมีข้อสงสัย ว่าหากต้องฉีดวัคซีนทั้งวัคซีนไขหวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด-19 ในช่วงเวลาใกล้ ๆ กัน จะต้องเว้นระยะห่างการฉีดกี่วัน กรมควบคุมโรค ชี้แจงดังนี้

- ในกรณีที่ประชาชนได้ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่แล้ว ให้เว้น ๑ เดือน จึงจะสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 (ซิโนแวค) เริ่มเข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒ ได้

- ในกรณีที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 (ซิโนแวค) เข็มที่ ๒ แล้ว ให้เว้น ๑ เดือน จึงจะสามารถฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ได้


- ในกรณีที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 (แอสตราเซนเนกา) แล้ว ให้เว้น ๑ เดือน จึงจะสามารถฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ และเว้นอีก ๑ เดือน จึงฉีดวัคซีนโควิด-19 (แอสตราเซนเนกา)

- ในกรณีที่ประชาชนได้ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่แล้ว ให้เว้น ๑ เดือน จึงจะสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 (แอสตราเซนเนกา) เริ่มเข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒ ได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว มีต้องการจะฉีดวัคซีนให้เว้นระยะ ๓ เดือน หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒

แนวทางการให้คำแนะนำ การฉีด COVID-19 Vaccine กับประชาชน

- ถ้าฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่แล้ว ให้เว้น 1 เดือน จึงฉีด Sinovac (เริ่มเข็ม 1 และเข็ม 2)
- ถ้าฉีดวัคซีน Sinovac (ครบ 2 เข็มแล้ว) ให้เว้น 1 เดือน จึงฉีดไข้วัดใหญ่
- ถ้าฉีดวัคซีน AstraZeneca แล้วให้เว้น 1 เดือน จึงฉีดไข้วัดใหญ่ และเว้น 1 เดือน จึงฉีด AstraZeneca
- ถ้าฉีดไข้วัดใหญ่แล้ว ให้เว้น 1 เดือน จึงฉีด AstraZeneca (เริ่มเข็ม 1 และเข็ม 2)



สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ต้องการจะฉีดวัคซีนให้เว้นระยะ 3 เดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 15-05-64



Facebook



Website

สถาบันปรีชาคนราตรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โทร. : 02-951-1170-79 Call Center : 02-590-3427, 02-590-3402

DDC สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๒๒ / ๒๕๖๔ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

กระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี

กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑

๑) หัวข้อเรื่อง ข้อปฏิบัติผู้ป่วย “โรคความดันโลหิตสูง” กับการฉีดวัคซีนโควิด-19

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข้อปฏิบัติผู้ป่วย “โรคความดันโลหิตสูง” กับการฉีดวัคซีนโควิด-19

“โรคความดันโลหิตสูง” ถือเป็นกลุ่มโรคประจำตัวและมีปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคโควิด-19 ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับต้น ๆ ดังนั้น ผู้ป่วยด้วยโรคนี้ จึงควรทำความเข้าใจถึงการเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

การเตรียมตัวสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจร่วมด้วย ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 จะต้องควบคุมความดันให้ไม่เกิน ๑๔๐ มม.ปรอท หากมีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ต้องทานยาสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีความดันโลหิตสูงเกินกว่าปกติจะต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์

ซึ่งหลังฉีดเรียบร้อยแล้วภายใน ๒ - ๔ ชั่วโมง ไม่ควรทำกิจกรรมใด ๆ เพื่อให้วัคซีนได้ทำงานอย่างเต็มที่ และทานยาประจำโรคได้ปกติ ยกเว้นทานยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือด ที่จะต้องแจ้งแพทย์ทันที เพราะอาจมีผลข้างเคียง คือ เลือดออกในกล้ามเนื้อตรงจุดที่ฉีดยา โดยมีลักษณะการบวมหรือช้ำเลือด

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่ควรหยุดทานยาหรือปรับยาเพื่อฉีดวัคซีน เว้นแต่กรณีที่แพทย์แนะนำให้หยุดยาชั่วคราว เพื่อให้ผลลัพธ์ของวัคซีนแม่นยำขึ้น

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๒๒ / ๒๕๖๔ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

กระทรวง กระทรวงการคลัง

กรม / หน่วยงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ช่องทางการติดต่อ สายด่วน คปภ. โทร. ๑๑๘๖

๑) หัวข้อเรื่อง เพิ่มความคุ้มครองประกันโควิด-19 ครอบคลุมถึงการฉีดนอกโรงพยาบาล

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เพิ่มความคุ้มครองประกันโควิด-19 ครอบคลุมถึงการฉีดนอกโรงพยาบาล

รัฐบาลได้ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ โดยตั้งเป้าให้ประชาชนกว่า ๗๐% จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ภายในปี ๒๕๖๔ ส่งผลให้ประชาชนให้ความสนใจในการทำประกันภัยการแพ้วัคซีนโควิด-19 เป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างความมั่นใจในการฉีดวัคซีนให้กับตนเองและครอบครัว

เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านประกันภัยอย่างเต็มที่ รัฐบาลโดย คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงประสานไปยังบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัยกำหนดให้ประชาชนผู้ถือกรมธรรม์จะต้องได้รับความคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่กระทำการโดยแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะดำเนินการ ณ สถานที่ใดก็ตาม เช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลทั่วไป

ให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลในการเร่งกระจายวัคซีนทั่วประเทศ ด้วยการขยายหน่วยบริการฉีดวัคซีน ณ จุดบริการนอกโรงพยาบาล/สถานพยาบาลเวชกรรม เช่น จุดบริการในห้างสรรพสินค้า หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการฉีดวัคซีนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือแพ้ภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานที่ใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ก็จะได้รับคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยที่ทำไว้ทุกประการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. โทร. ๑๑๘๖ หรือ LINE “@oicconnect”

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๒๒ / ๒๕๖๔ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

กระทรวง กระทรวงแรงงาน

กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการจัดหางาน

ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. ๑๕๐๖ กด ๒

๑) หัวข้อเรื่อง เตือนภัยนายจ้าง! อย่าหลงเชื่อ แอบอ้างรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตือนภัยนายจ้าง! อย่าหลงเชื่อ แอบอ้างรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว

แจ้งเตือนไปยังนายจ้างที่มีความต้องการจ้างงานแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ระวังตกเป็นเหยื่อจากมิจฉาชีพ ขณะนี้กระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบพบ ขบวนการแอบอ้างรับลงทะเบียนบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้างว่าสามารถลงทะเบียนบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๓,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ บาท

ขอย้ำว่า “การเปิดให้นายจ้าง/สถานประกอบการดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ต้องการจ้าง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก”

ดังนั้น หากนายจ้างหลงเชื่อ นอกจากจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการแอบอ้าง ทำให้เสียค่าใช้จ่ายแล้วยังเสี่ยงมีโทษในกรณีที่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยโทษของการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำความผิดซ้ำต้องโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา ๓ ปี

ส่วนคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้จะมีโทษปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท และถูกผลักดันส่งกลับประเทศ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๒๒ / ๒๕๖๔ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสื่อสารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค

ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.๑๔๒๒

๑) หัวข้อเรื่อง เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการเก็บเห็ดป่ามารับประทาน

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการเก็บเห็ดป่ามารับประทาน

สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ ปี ๒๕๖๔ พบผู้ป่วยแล้ว จำนวน ๑๒๑ ราย ซึ่งโรคดังกล่าวจะพบผู้ป่วยจำนวนมากในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) ของทุกปี เนื่องจากในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนและมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ เห็ดหลายชนิดจะเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเห็ดป่าในพื้นที่ธรรมชาติ

เห็ดป่า มีทั้งเห็ดที่รับประทานได้ และเห็ดพิษที่ไม่สามารถรับประทานได้ ซึ่งเห็ดดังกล่าวมีลักษณะใกล้เคียงกันมาก อาจทำให้สับสนได้ โดยทั่วไปประชาชนมักจะเก็บเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเห็ดที่ขึ้นใกล้ที่พักอาศัยมารับประทาน

ประชาชนบางรายขาดประสบการณ์ในการจำแนกชนิดของเห็ดที่รับประทานได้และรับประทานไม่ได้ ซึ่งเห็ดพิษไม่สามารถทำลายพิษได้ด้วยความร้อน หากเก็บเห็ดมารับประทานแล้วพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง เป็นตะคริวที่ท้อง ภายหลังการรับประทานภายใน ๖ - ๒๔ ชั่วโมง หากมีอาการเกิน ๒๔ ชั่วโมงจะทำให้เกิดภาวะไตวาย ตับวายจนทำให้เสียชีวิตได้ ผู้ที่มีอาการดังกล่าวควรรีบพบแพทย์ ด้วยการให้อาเจียนเศษอาหารที่ตกค้างออกมาให้มากที่สุด จากนั้นรีบนำส่งแพทย์โดยเร็วพร้อมกับตัวอย่างเห็ดพิษหากยังเหลืออยู่

กรมควบคุมโรค ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเก็บเห็ดจากธรรมชาติมารับประทานในช่วงนี้ ควรเลือกรับประทานเห็ดที่มาจากเพาะพันธุ์ เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง หลีกเลี่ยงเห็ดจากธรรมชาติ และไม่ควรรับประทานเห็ดร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.๑๔๒๒
